


69



Il consta par l'énoncé du programme qu'il exclut les tumeurs produites par les vents ou le déplacement des parties solides, le que l'on se doit borner aux tumeurs humérales qui suivant qu'elles arrivent ou subitement ou insensiblement sont divisées en celles de fluxion et en celles de Congestion.

Les tumeurs de fluxion sont produites par la sortie du sang hors de ses vaisseaux ouverts, ou par le passage de la portion rouge dans les artères lymphatiques et son séjour dans les latrémities des artères sanguines, aussi les tumeurs sont-elles phlegmonieuses ou inflammatoires,

Comme dans l'aneurisme Vray et dans la Varice le sang reste dans le Calibre de ses Vaisseaux et qu'il conserve son mouvement de Circulation ordinaire, les sortes de tumeurs qu'on appelle sanguines ne sont pas proprement regardées comme tumeurs de fluxion.

Les tumeurs de Congestion sont formées par le séjour et l'amas de la partie blanche du sang hors de ses tuyaux ou dans les tuyaux de Conduites, mais principalement de cette dernière manière le mouvement de Circulation du sang avec toutes les parties ou de la seule portion Rouge ne souffrant aucun dérangement notable par la formation ou l'accroissement de ces tumeurs, elles entraînent au moins pendant ce temps le aucun caractère inflammatoire.

L'on doit pourtant remarquer que si dans la suite les tumeurs gênent la Circulation du sang dans les vaisseaux sanguins, le qu'il soit obligé de se extravaser avec toutes les parties ou que pour le moins la portion rouge souffre la traversation.

laquelle séjourne dans les Capillaires sanguins artériels
Elles deviennent mixtes & participent toute à la fois des
affections des tumeurs de fluxion & de celles de Congestion.

Les liqeurs qui forment les tumeurs de Congestion se
ramassant ordinairement dans les vaisseaux qui leur
sont propres, dans leurs réservoirs, ou dans leurs Tuyaux
• Excretoires, il faut que le Calibre de ces Vaisseaux receive
de plus grandes dimensions en tout sens, & que les parois
qui forment la capacité croissent & se nourrissent à
proportion; d'où l'on peut conclure que les tumeurs de
Congestion ont communément une poche ou enveloppe
particulière dans leur Commencement & même dans
la suite, & que l'on doit les réduire presque toutes à la
classe des tumeurs enkistées.

Les différences que peuvent recevoir les tumeurs de fluxion
ne renferment rien qui soit relatif avec la manière
de les opérer & par conséquent avec le sujet de ce
memoire; ainsi, l'on les passe sous silence, pour faire
remarquer que ces sortes de tumeurs se terminent par
la résolution, l'endurcissement, la suppuration & la gangrene.

C'est par résolution, lors que par le moyen de la
contraction des vaisseaux sanguins, le jeu systaltique de
autres solides, & la chaleur des parties voisines, les
matieres arrêtées ou extravasées sont attirées au point
de rentrer dans les veines sanguines ou de se dissiper
par la transpiration.

La voie de l'endurcissement a lieu, lors que les
même causes font dissiper ce qu'il y a de plus subtil

Et de plus serena, pendant que ce qu'il y a de plus grossier
reste et acquiesce un parfait repos en se touchant par
de plus grandes surfaces.

Il survient une suppuration, lors que le sang
extravasé et sorti de ses digues est cuit et trituré par
l'action des vaisseaux sanguins et des autres solides
du voisinage, par la chaleur et la transpiration de
parties voisines, et que se faisant une espèce de dissolution
des solides brisés et divisés, il en résulte un fluide
nouveau qu'on appelle pus, ou pour l'exprimer en d'autres
termes, que la tumeur dégénère en abcès.

Enfin les tumeurs de fluxion se terminent par la
Gangrene, lors que la chaleur et la transpiration
vivifiante des parties voisines vient à manquer, le
sang se changeant en une substance morte, il se pourrit,
devient septique, et réduit les solides mêmes dans un
état de putrefaction.

Pour ne pas porter ce Mémoire au delà de ses
justes bornes, on ne détaillera pas les différentes très
étendues des tumeurs de Congestion, on aura seulement
égard à celles qui conduisent en Général à la méthode
de traiter solidement les maladies.

On tire les différences des Causes qui produisent ces
tumeurs, des matières qu'elles renferment, de leurs Consistances
de leur indolence, ou de leur insensibilité, des densités
qui les terminent et de plusieurs autres modifications qui



Les accompagnent; ainsi on en établit de serophuleux, de veroleux &c; il en est de lymphatiques, de graisseux &c; on en trouve de dures et de molles, d'indolentes et de douloureuses; Les dures restant indolentes sont nommées schirreuses, si conservant leur dureté, elles deviennent douloureuses, on les appelle Cancéreuses; on les distingue de benignes et de malignes, d'adhérentes et de mobiles, de simples et sans suppuration. et de Mixtes et avec suppuration

Les tumeurs de Congestion se terminent aussi comme celles de fluxion par les quatre voies expliquées ci dessus, avec cette différence que ces changements se passent lentement, et que lors qu'elles suppurent ou tournent en gangrene, elles deviennent compliquées et perdent leur état de simplicité

Faisant réflexion sur ce qui a été remarqué dans l'examen des tumeurs de fluxion, on conclura que celles qui finissent par la résolution, n'ont pas besoin d'opération, que celles qui s'indureissent doivent être opérées comme celles de Congestion, et être par conséquent rejetées dans cette classe, et que celles qui tournent en gangrene demandent une cure propre à cette maladie le plus conforme aux Vues du Programme; ainsi l'on s'attache simplement au traitement des tumeurs de fluxion qui suppurent ou dégèrent en abcès

Les Vues de la chirurgie doivent se réduire à traiter

Le pus renfermé dans l'abcès, à retrancher tous les obstacles
à la production des nouvelles chairs, et à conduire la plaie
rendue simple par l'opération à une bonne cicatrice; on peut
pour parvenir à ce but se servir du fer ou du cautère
suivant les différents états des tumeurs. ..

Pour choisir à propos l'un de ces secours par préférence
à l'autre, on fera les attentions suivantes.

Lors que la tumeur suppurée est profonde, qu'elle est
accompagnée de Callosité, qu'il se rencontre une grande
étendue de tegumens à retrancher à cause du Volume
Considérable de la tumeur, que la matière renfermée se
met seulement en jeu le la suppuration, ou que les chairs
sont molles, le peu propres à être saisies par des
instruments convenables il faut se servir du cautère potentiel,
dont la Composition est très connue, le son suitera
scrupuleusement tous les scarrothiques ou l'utra l'arsenic le
les Composition, aussi bien que le sublimé Corrosif,
l'observation suivante est fondée sur cette méthode de traiter
les tumeurs profondes.

Le 6 aoust 1742 je fus appelé pour voir le Sieur Bourque
je le trouvais attaqué depuis long temps d'une tumeur très Considérable,
placée du côté droit du bas ventre, accompagnée de fièvre &
de plusieurs accidens fâcheux, le sur laquelle on avoit déjà
appliqué des remèdes de toute espèce, dans la vue de la



Résoudre ou de la faire Suppurer, cette tumeur occupoit
presque tout l'espace qui se trouve depuis la Côte
flottante jusques vers la hauteur de la Crête des os des
jils et depuis les apophyses transverse de Vertebres de
Lombes jusques vers le voisinage de la ligne blanche
Du même côté droit, ayant examiné la tumeur avec
attention, le flot se fisoit sentir, mais sous une grande
épaisseur des parties latérales; on la jugea située entre
le petit oblique de la transverse droite, ou entre le dernier
muscle et le péritoine, je craignois avec raison l'effusion
du pus dans le bas ventre, si l'on ne prevenoit ce
malheur par l'ouverture de l'abcès; ainsi j'appliquai
sur le champ une 1.^e et ensuite une 2.^e rangée de pierres
à cauter, ayant soin dans l'application de ménager la
peau au pus; l'escarre fut ouvert suivant toute sa
longueur avec le bistoury, il sortit plus d'une pinte de
pus très puant et fort épais, j'employai dans la suite
des onguens d'abord pourrissants et ensuite detergifs, les
injections Vulnérâires de plusieurs especes, même celle de
l'eau Tormale sur la fin on joignit les remèdes intérieurs
propres à adoucir et à rendre balsamique le pus nourricier,
et enfin la plaie fut conduite à une heureuse cicatrice
dans une quarantaine de jours.

Mais lors que les tumeurs abscedées sont superficielles
que les tegumens sont minces, les chairs abouées &c. &c.

quelles menacent pourriture, et qu'il s'agit de ménager —
quelque partie renfermée dans la tumeur, ou placée dans
dans son voisinage, on doit avoir recours au fer, comme
aussi lors que les tumeurs d'effusion résistent à la
suppuration par une disposition qui tire sur la
Gangreneuse, ou qui approche du caractère charbonneux.
Les 2^{es} observations qui suivent prouveront à qui vient
être avancée



Le 11^e janvier 1732, je trouvai dans l'hôpital d'Inflan
Le nommé Claude Benoist dit blondin tambour des Grenadiers
du Regt, avec une tumeur qui occupoit la région ombilicale —
après un examen considérable, je reconnus qu'il y avoit
beaucoup de pus et que de plus une portion d'intestin y
étoit renfermée, la tumeur manifestement dans le
maneuement de la tumeur; le malade d'ailleurs vomissoit
depuis 24 heures les matières fécales; la Consultation ayant
été convoquée promptement il fut décidé que l'opération
se feroit sans aucun délai et conséquemment je commençai
par une petite incision sur la tumeur avec mon bistouri, —
jusqu'à ce que la matière s'élançant comme un jet d'eau
à la faveur de la sonde introduite dans la plaie, je
glissai mon bistouri le long de l'abcès dans toute son
étendue. L'intestin fut trouvé flottant dans le pus et couvert
pourtant d'une hernie ayant importé tout ce qui
pouvoit gêner mes pansements, et mon opération, je

Je couris un sinus a l'oblique externe, qui me conduisit
sur la sac herniere que j'ouvris dans toute sa longueur,
pour debrider l'etranglement qui etoit au transversal;
l'Intestin fut reduit; je finis l'operation suivant la
methode que la chirurgie a accoutumee de pratiquer; le
je traitay dans la suite la playe conformement aux
mêmes Regles, jusques vers la fin de mars au quel tems le
malade sortit de l'hospital parfaitement Guerri

Le nomme huger frater du Regt fut attaque dans le mois de
mars 1729. d'une tumeur phlegmoneuse qui etoit placee
a la partie posterieure le superieure du col, et qui
surpassoit la grosseur du poing apres avoir ete traitee
pendant quelques jours avec des cataplasme differens, elle
se rendit de plus en plus facheuse et bien loin de prendre
le train de la suppuration, elle menaçoit de celui de
la gangrene plusieurs chirurgiens assemble trouvant a
propos de faire sur le champ une incision cruciale suivant
toute l'epaisseur de la tumeur, le d'emporter en même temps,
Le 4. angles jointoy l'operation suivant la decision portee
par le conseil le progres des accidens fut arrete dans 24
heures je pansay la playe suivant les regles de l'art et
malgre la fièvre maligne qui etoit de la partie, la
guerison fut entiere dans l'espace de trente deux jours
la resolution des tumeurs de Congestion se fut

Totalement l'opération; et leur changement en gangrene, —
Comme dans l'autre espèce de Tumeurs, exige un traitement
particulier à cet état de mortification, ainsi les tumeurs
de Congestion ne sont sujettes à l'opération que lors qu'elles
s'indurcissent ou deviennent schisreuses, et qu'elles se terminent
ou menacent de se terminer par la suppuration ou
ulcération. pour prendre une détermination fondée sur
les Regles de la bonne chirurgie, et choisir à propos le
fer ou le Caustere dans ces circonstances, on fera
les réflexions suivantes

1.^o Les tumeurs de Congestion dures et Schisreuses, ou
même les molles prennent difficilement le train de la
suppuration

2.^o quand on les neglige et qu'on les abandonne à
leur développement, elles s'ulcerent souvent et deviennent
Cancéreuses.

3.^o Les applications des Topiques sur tout fondans et
celles des remèdes Scarrotyques et irritans, Effarouchent les
matieres qui forment ces sortes de tumeurs et les Rendent
Carcinomatueuses.

4.^o l'opération faite Methodiquement et à bonne heure
previent les facheux evenemens

5.^o Les tumeurs à operer sont souvent placées dans le
voisinage des tendons, des membranes, des vaisseaux
Considerables ou autres parties dont les piquures ou blessures



Attireroient des accidens funestes, ou bien elles sont véritablement adhérentes à des parties qu'il faut nécessairement ménager; ainsi l'on doit prendre des précautions pour éviter ces désordres.

6.^o Les coupes sont sujettes à des hémorrhagies très-fraîches, si on ne les opère & si on ne les dégage exactement des autres parties, ou si l'on n'emporte leur tige en entier.

7.^o Participation imparfaite des coupes & de leurs poches aussi bien que celles des tumeurs carcinomateuses, laissent le germe d'une tumeur nouvelle & d'un caractère aussi mauvais que le 1.^o

8.^o Dans l'opération de la tumeur, on doit se proposer d'abréger la durée du pansement des plaies simples qui lui succèdent, d'abréger aussi le tems destiné à la formation des cicatrices, & d'éviter leur difformité. Sur tout dans les endroits exposés à la vue, en conservant la peau qui couvroit les tumeurs, autant qu'il est possible.

9.^o La manière d'opérer qui s'exécute avec le plus de dextérité & de vitesse raccourcit la durée de l'opération & par conséquent celle des douleurs que le malade se voit obligé de souffrir. ainsi on doit préférer cette méthode d'opérer à toute autre qui ne procure pas les avantages.

Il est aisé de conclure par les faits de pratique que l'on vient d'établir que les tumeurs de Congestion qui demandent l'opération doivent par préférence être opérées avec le fer, soit par ce qu'il ne communique aucune mauvaise qualité aux matières qui forment les tumeurs & qu'il prévient les accidents qui pourroient leur survenir & avant & après l'opération, soit par ce qu'il retranche les obstacles qui pourroient déranger une cicatrice prompte, & vive, solide & accompagnée de toutes les circonstances de la guérison la plus parfaite, on donne au contraire l'exclusion au Caustère dont l'usage ne peut être que funeste par des raisons qu'on a déjà détaillées & qui tout au plus ne peuvent avoir lieu que pour consommer le Reste des tumeurs de Congestion, que le fer n'a pu achever d'importer.

Il n'est pas permis d'entrer dans le détail des différentes manières d'opérer par le fer, les tumeurs auxquelles ce genre d'opération convient, suivant les principes qu'on vient d'établir on se contentera de proposer quelques unes des méthodes dans les 3. observations suivantes

Le 5. mars 1724. je visitay le nommé Dumoulin, Caporal de Grenadier de Regt. à l'occasion d'une tumeur enkistée qu'il avoit depuis 27. ans entre les deux épaules, la-quele s'étoit volée depuis 6. mois étant accompagnée de très vives douleurs qui l'empêchoient de se coucher sur le dos; je fis une incision cruciale sur la tumeur,



Je l'a disséquay apres avoir separé les tegumens; la
Casse avoit plus d'un pied de circonférence, le kiste
tenoit de la Nature du Cartilage, la tumeur enkistée, —
je coupai avec des ciseaux ce qu'il y avoit d'usé —
dans les lambeaux que je rapprochai; ayant pansé dans —
la suite ma playe suivant les Regles ordinaires, Le malade
fut Guéri dans 29^{es} jours

Le 15^{es} Janvier 1732 Charles Francois dit Blondin Soldat —
du Regt Comp^{te} Colonelle vint a l'hôpital d'Imbrun a l'occasion
d'une tumeur enkistée qu'il avoit a la partie antérieure —
du Col, de la Grossueur d'une grosse poire, le qui s'étendoit
depuis la partie supérieure du Cartilage thyroïde jusqu'au
haut du Sternum; l'augmentation de cette tumeur ayant jeté
le malade dans une difficulté de respirer avec extinction
de Voix, j'ouvris promptement la tumeur, d'où il sortit
beaucoup de pus qui ressembloit a du Suif; j'emportay
une partie du kiste & le kiste tomba par suppuration. La
partie Collée sur la trachée artere se cassa par sa chute
a nud de la longueur d'un pouce. je mis en usage les remèdes
qui me parurent les plus propres a procurer un bon
fond, sans pouvoir y reussir, il resta une petite fistule
avec un Invoïement.

Monsieur de Longueval Gentilhomme de quercy avoit une
tumeur d'une grosseur qui l'aidoit pres de deux fois le volume

Un concombre ordinaire dont elle jmitoit la figure, avec
cette circonstance que les deux extrémités étoient un peu
plus arrondies le tronquée de que la face postérieure ~~était~~
étoit un peu aplatie elle étoit placée sur la partie
antérieure le latérale du bas de la cuisse gauche couvrant
le genou, mais s'étendant un peu plus vers le condyle
externe du fémur quelle cachoit. on avoit employé beaucoup
de scarrotyques le même les ligatures pour la détruire, mais
elle repoussoit toujours; on l'avoit rendue plus dure dans
certains endroits par l'irritation de ces remèdes; il y
survenoit de temps en temps des hémorragies très considérables,
la base étoit tant soit peu moins large que le reste de
la tumeur qui étoit adhérente au tendon aponeurotique
des extenseurs de la jambe, la cette adhérence s'étendoit
jusques vers le condyle latéral, on détermina l'opération
par une consultation d'un habile médecin le deux chirurgiens
le 20^e 7^{bre} dernier je fus choisi pour la faire je commençay
par une incision à la peau non ornée de 3 ou 4^e doigt, sur
l'endroit de la tumeur que l'on pouvoit saisir plus aisément,
dissequant avec le doigt & le bistouri ce qui répondoit à
l'incision; je continuay de même sur le dehors jusqu'au bas
de la fesse, & enfin sur le côté intérieur j'observais
les mêmes précautions, détachant le kiste autant qu'il me



seut possible; mais le voyant valoir dans certains endroits,
il adhérait au tendon aponeurotique au ligament de la
rotule le jusque vers le Condyle externe, je disséquay
avec le bistouri ce que je put, sans interrompre les parties
aponeurotiques & autres déjà mentionnées. La tumeur
ayant été importée, le une petite artériole fournissant
du sang considérablement j'en fis la ligature, le pansement
avec le charpi crute & ensuite avec les Unguens convenables;
j'eut recours à un doux scarrotique pour importer le reste
du Kiste; le Conduit se plaça à cicatrice, le malade
a été guéri totalement le 6.^e de 9.^e, & par le moyen
des loins de Callarue que j'ai fait venir pour douer cette
partie^{te} ne pouvent faire mieux par rapport à la saison, il
a presque recouvré la liberté des mouvements de la jambe
qui étoient très gênés auparavant



Crémoux de Ginia
Inguercij

